

Aus der Universitäts-Frauenklinik Bonn
(Direktor: Professor Dr. Harald Siebke).

**Morbidität und Mortalität
im Wochenbett
nach normaler Geburt**
(Beobachtungen an etwa 2000 Entbindungen
in der Universitäts-Frauenklinik Kiel)

INAUGURAL-DISSERTATION

zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 25. Mai 1937
von
Karlheinz Küntzel
Arzt
aus Grossen a. d. Oder.

Bonn 1937
Anton Brand

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der
Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Rupp
Korreferent: Prof. Dr. Siebke



Meinen Eltern gewidmet.

Morbidität und Mortalität im Wochenbett nach normaler Geburt.

3500 Frauen sterben jährlich in Deutschland am Wochenbettfieber. Nicht allein, daß diese dem deutschen Volke verloren gehen, es verlieren auch weit über 3500 Kinder ihre Mutter. Hier liegt eine der dringlichsten und vornehmsten Aufgaben für den deutschen Arzt.

Was sind die Gründe für dieses Sterben? Warum überleben nicht alle Mütter die Geburt eines Kindes?

In dieser Arbeit sind 2035 Spontangeburt der Kieler Universitäts-Frauenklinik (Direktorat Prof. Dr. Schröder) der Jahrgänge 1930—33 zur Klärung der erwähnten Fragen systematisch untersucht und zusammengestellt worden.

Unter Spontangeburt verstehen wir den regelrechten Partus einer Frau ohne ärztlichen Eingriff; Episiotomien, Wendungen usw. sind ausgeschlossen, lediglich kleine Hautabschürfungen bis zum Dammriß 1. Grades wurden als zur Spontangeburt gehörig angesehen. In der Kieler Klinik ist es üblich, die Gebärenden nur dann vaginal zu untersuchen, wenn man sich mit anderen Mitteln kein klares Bild über den Stand der Geburt machen kann. Die vaginale Untersuchung wird unter den bestmöglichen aseptischen Kautelen, wie sie zu jeder geburtshilflichen Operation notwendig sind, vorgenommen: 10 Min. waschen in fließendem, heißem Wasser, 10 Min.

waschen in 70%igem Alkohol. Lediglich die zu Lehrzwecken schon mehrere Wochen vor dem Partus aufgenommenen Hausarbeiterinnen werden in Kursen von Studenten und Hebammen-Schülerinnen zu Übungszwecken vaginal untersucht. Die vaginale Untersuchung bei der Aufnahme von Hauschwangeren wurde außer acht gelassen da sie schon zu lange Zeit vor dem eigentlichen Partus stattgefunden hatte.

Zunächst noch etwas über die rektale und vaginale Untersuchung. Die vaginale Untersuchung wurde bereits in den frühesten Zeiten der Geburtshilfe geübt. Die rektale Untersuchung haben 1893 K ö r n i g und R i e ß (S t r a ß b u r g) unabhängig voneinander angegeben. Diese Untersuchung wird in der Kieler Klinik fast ausschließlich geübt. Die Meinungen über den Wert der rektalen Untersuchung sind in der geburtshilflichen Literatur sehr verschieden. Die Gegner der rektalen Untersuchung heben hervor, daß sie nicht die diagnostischen Feinheiten besitze wie die vaginale. A h l f e l d , B u m m und S t ö c k e l lehnen sie aus diesem Grunde ab. Sie erwähnen sie deshalb kaum in ihrem Lehrbuch. F i s c h e r , M e n g e , J a s c h k e , P a n k o w , W a l t h a r d und S c h r ö d e r betonen immer wieder den Vorteil der Asepsis dieser Untersuchungsmethode.

A. M. C l a y e hebt hervor, daß der Arzt bei der vaginalen Untersuchung intra partum wohl keine pathologischen Keime von außen in die Scheide bringt, vorausgesetzt, daß er diese Untersuchung unter bester Asepsis vornimmt, daß er aber Keime, die in der Scheide an

sich harmlos find, durch seine Manipulationen in die Nähe des Muttermundes transportiert, wo sie gefährlich werden können.

K e h r e r, ein Gegner der rektalen Untersuchung, hält dieselbe für überflüssig, da die vaginale Untersuchung, unter aseptischen Kautelen ausgeführt, für die Gebärende ungefährlich sei. K e h r e r meint, daß durch die rektale Untersuchung die Gefahr einer Infektion mit Bact. coli akut wird. Das kann man jedoch verhindern, indem man vor der rektalen Untersuchung einen sterilen Wattebausch vor die Vulva legt und die Untersuchung selbst mit einem sterilen Fingerling vornimmt. Diese Methode wird in der Kieler Klinik geübt.

Reinhold D e m m e nimmt folgende Stellung ein: um zu zeigen, daß bei rektaler Untersuchung die Morbidität durch Infektion geringer ist als bei vaginaler, führt er die Statistik von H e i m a n n und A u f t e r an, die folgendes sagt:

bei 367 nicht untersuchten Fällen ist die Morbidität	7,9%
bei 132 rektal untersuchten Fällen	6,8%
bei 221 vaginal untersuchten Fällen	20,6%

Er gibt zu, daß die vaginale Untersuchung genauer ist als die rektale, behauptet jedoch, es käme weniger auf Einzelheiten als auf einen guten Überblick über Stand und Fortgang der Geburt an. Vor allen Dingen bringt man bei der rektalen Untersuchung keine Keime aus dem Scheideneingang in die Nähe des Muttermundes. Ein Nachteil der rektalen Untersuchung ist das Auftreffen der hinteren Vaginalwand mit dem Septum vaginale

auf den äußeren Muttermund. Dies bedeutet jedoch nur ein Einmassieren von arteigenen Keimen, gegen die der Körper immun ist. Wichtig bei der rektalen Untersuchung ist nach D e m m e's Meinung das Heraufführen des untersuchenden Fingers an der hinteren Rektalwand. Dadurch vermeidet man mit Sicherheit ein Hinaufmassieren des Scheideninhalts.

K r ö n i g, der Erfinder der rektalen Untersuchung, betont vor allen Dingen die geringe Infektionsgefahr bei seiner Methode.

A. M. C l a y e findet bei vaginaler Untersuchung um ein Drittel höhere Morbidität als bei der rektalen, nämlich 9,1% und 6,6%. Dabei unterscheidet er morbid und submorbid. Unter submorbid versteht er bereits zwei Fieberzacken von 37,2° axillar. C l a y e fordert am Schlusse seiner Ausführungen vollständiges Verbot der vaginalen Untersuchung für die Hebammen, Einschränkung derselben für den Arzt. Diese Forderung ist an der Kieler Klinik bereits erfüllt.

S c h u l t h e i ß - B a s e l hat 12 575 Fälle von Spontangeburt auf ihre Morbidität untersucht und zwar unter Berücksichtigung der rektalen und vaginalen Untersuchung sowie des vorzeitigen Blasenrisses. Im allgemeinen stellt er nur einen geringen Unterschied im weiteren Geburtsverlauf fest, begründet dies jedoch damit, daß eben die aseptischen Kautelen, unter denen in der Baseler Klinik gearbeitet wird, weit bessere sind, als die des praktischen Arztes. Lediglich bei den Fällen mit

einem vorzeitigen Blasenprung, der 40 Stunden zurücklag, hat er eine größere Differenz gefunden, nämlich:

R.U. 127 Fälle:

afebril ... 7 = 5,15 %; subfebril (Temp. 37,1—37,9°)
95 = 77,95 %; febril ... 25 = 16,54 %

V.U. 39 Fälle:

afebril ... 1 = 2,56 %; subfebril 22 = 56,1 %; febril ...
16 = 41,03 %.

Er kommt zu dem Schluß, daß die Keime, die bei der V.U. vom Introitus in die oberen Teile der Scheide geschleppt werden, eine gewisse Zeit brauchen, um in die Uterushöhle vorzudringen, namentlich bis sie dort zur Weiterentwicklung bzw. als Krankheitserreger zur Auswirkung gelangen. Bei der V.U. sind 2 Sepsisfälle vorgekommen, wovon einer ad exitum kam.

Wie gelangen nun die Bakterien ins Gewebe? Durch das intakte Epithel kann kein Bakterium eindringen. Es muß also auf jeden Fall ein Epitheldefekt vorliegen. Die Bakterien können jedoch nur durch einen frischen Epitheldefekt wandern, da sich ihnen sonst ein schützender Leukocytenwall entgegenstellt. Außerdem sammeln sich an den Rändern von Erosionen besonders gern Streptokokken.

Miller, Ben Marowitz und E. Hodgen berichten folgendes: Bei Spekulumuntersuchungen bei Schwangeren zeigten sich bei Mehrgebährenden 80 % Erosionen, bei Primiparae 10 %. Bei 175 Fällen wurden Abstriche vom Erosionsgrund gemacht, dabei fanden sich in 10,25 % der Fälle Streptokokken, in 3,66 % haemolytische

Streptokokken. Daraufhin gingen die Verfasser dazu über, alle Erosionen bei Schwangeren bis zur 28. Schwangerschaftswoche zu kauterisieren. Sie haben das bei 2000 Schwangeren getan. Der Geburtsverlauf war ein günstiger. Es ist kein Fall von Sepsis vorgekommen. Die Verfasser fordern, daß jede Erosion als bedeutungsvolles Gefahrenmoment für die Gebärende aufgefaßt werden muß. Allerdings wird betont, daß die Anwesenheit von Streptokokken noch nichts mit Sepsis zu tun habe.

Ich habe 2033 Spontangeburt der Kieler Frauenklinik (Jahrgang Mitte 1930—33) zusammengestellt und folgendermaßen eingeteilt:

1. In die von draußen unmittelbar auf den Kreißsaal eingelieferten Gebärenden;
2. In Gebärende, die als Hausarbeiterinnen mehrere Wochen vor der Entbindung in der Klinik Aufnahme fanden.

Bei beiden Fällen wurde die vaginale Untersuchung besonders berücksichtigt; die nicht vaginal Untersuchten sind fast ausschließlich rektal untersucht worden.

Die von draußen Eingelieferten sondern sich wiederum:

- a) in Gebärende, deren Scheideninhalt untersucht worden war (mit Hilfe des sog. „Scheidenpinsels“);
- b) in Gebärende, deren Scheidenflora unbekannt war. Der „Scheidenpinsel“ ist ein mit steriler Watte umwickeltes Stäbchen, das in die Scheide eingeführt wird. Das an der Watte haftende Sekret wird dann bakteriologisch untersucht.

Unter der Geburt wird das saure Milieu der Scheide durch das alkalische Fruchtwasser in ein schwach alkalisches umgewandelt, in dem andere Bakterien besser gedeihen als die harmlosen Döderlein'schen Stäbchen.

Nach Schröder unterscheidet man drei Reinheitsgrade:

Die Flora I.^o zeigt unter dem Mikroskop lediglich Döderlein'sche Stäbchen = *Baz. vaginalis*, die grampositiv sind.

Bei der Flora II.^o finden wir bereits eine stärkere Verunreinigung mit anderen Keimen, doch sind auch hier die Döderlein'schen Stäbchen überwiegend.

Die Flora III.^o ist die bunte Milchflora. Sie setzt sich zusammen aus Diplo-, Strepto- und Staphylokokken sowie Colibakterien.

1. Von draußen eingelieferte.

(a. Bakterienbefunde).

Von den 1465 von draußen eingelieferten Fällen boten 1243 einen fieberfreien Wochenbettsverlauf. Bei 569 wurde ein Scheidenpinfel angefertigt. Bei 6 Patienten ohne Scheidenpinfel hat man Abstriche gemacht. Für den Rest, nämlich 668 Patienten, liegen bakteriologische Untersuchungen nicht vor.

Die 569 Fälle mit Scheidenpinfel setzen sich folgendermaßen zusammen:

Tabelle 1.

Bact. vaginalis rein I. ^o	79 Fälle
Bact. vaginalis überwiegend II. ^o	34 „
Bact. vaginalis + Staphylokokken	95 „
Bact. vaginalis + Streptokokken	37 „
Staphylokokken rein	6 „
Staphylokokken überwiegend	48 „
Streptokokken rein	35 „
Streptokokken überwiegend insbef. mit Staphylokokken	184 „
Bact. coli rein	3 „
Bact. coli überwiegend	5 „
Bact. coli + Streptokokken	8 „
Bunte Mischflora	35 „

Obwohl dies alles fieberfreie Fälle sind, müssen wir feststellen, daß der an sich so gefürchtete Streptokokkus in Verbindung mit Staphylokokken der weitaus häufigste Vertreter ist. Er muß also in einer gefunden Scheide auch unter der Geburt nicht unbedingt virulent werden. An 2. Stelle stehen der Baz. vaginalis + Staphylokokken in 95 Fällen und an 3. der reine Baz. vaginalis in 79 Fällen. Die anderen Bakterien spielen eine untergeordnete Rolle.

Von den 1243 Fällen wurden nur 38 vaginal unter der Geburt untersucht = 3%.

Es stehen ihnen 222 fieberhaft erkrankte Fälle gegenüber. Auf diese verteilt sich der bakteriologische Befund wie folgt:

Tabelle 2.

Bact. vaginalis I. ^o	6 Fälle
Überwieg. Baz. vag. II. ^o	4 „
Baz. vag. + Staphylokokken	9 „
Baz. vag. + Streptokokken	3 „
Staphylokokken	4 „
Überwiegend Staphylokokken	3 „
Streptokokken	9 „
Überwiegend Streptokokken insbef. m. Staphylokokken	34 „
Bact. coli rein	— „
Bact. coli überwiegend	— „
Bact. coli + Streptokokken	1 Fall
Bunte Mischflora	3 „
Kein Scheidenpinfel	146 „

In Tabelle 1 und 2 sind die einzelnen Bakterien aufgeführt, die unter der Geburt bei fieberfreien (1) und später fieberhaft erkrankten Kreißenden (2) in der Scheide gefunden werden. Auch in Tabelle 2 finden sich die Streptokokken in Verbindung mit Staphylokokken als häufigste Vertreter. Prozentual bestehen nur geringe Unterschiede zwischen Tabelle 1 und 2. Bei den fieberfreien Fällen macht die Gruppe Streptokokken + Staphylokokken 14,8%, bei den fieberhaften 15,5% aus. Wie gefährlich diese Kombination von Keimen ist, zeigen 2 Peritonitis-Todesfälle. Der Exitus einer dritten Patientin wurde durch Herzinsuffizienz mit Stauungserscheinungen hervorgerufen; der bakteriologische Befund (Baz. vagin. und Staphylokokken) spielte dabei keine Rolle.

(b. *Vaginale Untersuchung*).

Von den später nicht fieberhaft erkrankten 1243 Frauen wurden 38 = 3% vaginal untersucht. Von den später fieberhaft erkrankten 222 von draußen eingelieferten Fällen sind 16 vaginal unter der Geburt untersucht worden, = 7,2%. Es ist ein wesentlich höherer Prozentsatz als der der Fieberfreien und läßt auf die Gefährlichkeit der vaginalen Untersuchung unter der Geburt schließen.

2. Hausarbeiterinnen.

Von den 570 sind 102 später fieberhaft erkrankt = 18%. Nur bei 13 von den 468 fieberfreien HA. ist der bakteriologische Befund bekannt (Scheidenpinfel).

(a. *Bakteriologischer Befund*.)

Es fanden sich:

Tabelle 3.

Baz. vaginalis	3 Fälle
Baz. vaginalis überwiegend	2 „
Staphylokokken überwiegend	2 „
Streptokokken überwiegend, insbes. mit	
Staphylokokken	5 „
Milchflora	1 Fall
Wiederum steht, selbst bei dieser kleinen Zahl, die Gruppe Streptokokken + Staphylokokken an 1. Stelle. Vom größten Teil der nicht bakteriologisch untersuchten 455 HA. liegt das Ergebnis der Scheidenabstriche vor:	
Flora I. ^o	bei 122 Fällen

Flora II.^o bei 83 Fällen

Flora III.^o bei 155 Fällen

Ferner wurde fünfmal eine Gonorrhoe festgestellt. In keinem dieser letzten fünf Fälle ist es zu einer ascendierenden Infektion im Wochenbett gekommen.

Unter den später fieberhaft erkrankten 102 HA finden sich nur einzelne, bei denen ein bakteriologischer Befund erhoben wurde; deshalb wird auf eine Zusammenstellung verzichtet.

(b. Vaginale Untersuchung.)

Es wurden von den fieberhaften 468 HA mehrmals im Unterricht vaginal untersucht 234, unter der Geburt und mehrmals im Unterricht 21 und nur unter der Geburt 3 Pat. = 258 Pat. = 55%.

Von den 102 fieberhaft erkrankten HA sind wiederholt vaginal untersucht worden 45 Fälle = 44%, also etwas weniger als unter den später nicht Erkrankten, während die entsprechenden Zahlen bei den von draußen eingelieferten Frauen sich umgekehrt verhalten (7,2 : 3%).

Weiter wurden 35 Fälle nur einmal vaginal untersucht = 34,3%. Diese Untersuchungen liegen meist Monate zurück und sind deshalb absichtlich nicht berücksichtigt worden.

Der Hundertsatz der fieberhaft erkrankten HA liegt etwas höher als bei den von draußen eingelieferten Frauen: 102 von 470 = 18% gegenüber 222 von 1465 = 15,1%

Woran erkrankten die Wöchnerinnen? Wir unterscheiden genitale und extragenitale Erkrankungen.

Bei den von draußen eingelieferten 222 später fieberhaft erkrankten Patienten ist die Zahl der genitalen Komplikationen 182 — 81%, die der extragenitalen 40 = 19%.

Weitaus an erster Stelle stehen die Ascensionszacken mit 107 Fällen. Es sind Fieberzacken, die im Wochenbett ohne weitere Krankheitszeichen auftreten. Sie verteilen sich auf 46 Fälle mit 1 Zacke, 48 Fälle mit wiederholten Zacken und 135 Fälle mit anhaltendem Fieber von axillar 38° und darüber. Dann kommen 34 Fälle von Initialzacken, das sind einmalige unter der Geburt auftretende Zacken von 38° und darüber (axillar gemessen); ferner 16 Fälle mit Endometritis, 12 mit riechenden Lochien, 7 mit gonorrhöischer Ascension, 2 Todesfälle durch Peritonitis, 2 Thrombophlebitiden und 2 Fälle mit positiver WaR.

Extragenital erkrankt sind 40 Patienten, meist an Mastitis, Cystopyelitis, Angina oder Lungenkomplikationen, 3 an Pyelitis.

Die später fieberhaft erkrankten 102 Hausarbeiterinnen weisen trotz der häufigeren vaginalen Untersuchung einen höheren Prozentsatz extragenitaler Erkrankungen auf als die weniger oft vaginal untersuchten von draußen eingelieferten Kreißenden, nämlich 24,5% gegenüber 19%.

Bei den genitalen Erkrankungen führen die Initialzacken mit 35 Fällen, dann folgen Ascensionszacken mit

27, „riechende Lochien“ mit 6, Endometritis mit 5, Ascension durch Gonorrhoe mit 3 Fällen, und ein parametritischer Abzefß.

Extragenital erkrankt find 25 Hausarbeiterinnen (24,5%). An 1. Stelle steht auch hier die Mastitis mit 6 Erkrankungen, es folgen Cystopyelitis, Infektionskrankheiten u. a.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen.

Zusammenfassend ist folgendes zu sagen:

Die Morbidität der HA. ist im Wochenbett nach Spontangeburt größer als die der von draußen eingewiesenen Kreißenden; nämlich 18% gegenüber 15%.

2. Diese erhöhte Morbiditätsziffer wird im wesentlichen durch die verhältnismäßig größere Häufigkeit der extragenitalen Erkrankungen im Wochenbett erreicht; nach deren Abzug betragen die Vergleichszahlen 13,5 (für die HA.) und 12,5%.

3. Dieses geringe Überwiegen der genitalen fieberhaften Komplikationen bei den HA. auf die häufiger vorgenommene vaginale Untersuchung zurückzuführen, ist nicht angängig; denn von den später fieberhaft erkrankten HA. sind 44% von den später nicht fieberhaft erkrankten 55% vaginal untersucht worden. Das war dagegen bei den von draußen eingelieferten, später fieberhaft Erkrankten in 7,2%, bei den später nicht fieberhaft Erkrankten in 3% der Fälle geschehen. Für beide Gruppen ergibt sich jedoch fast die gleiche Morbiditätsziffer. Der Einfluß der vaginalen Untersuchung unter der Geburt auf den Wochenbettsverlauf bei den HA. tritt deshalb nicht klar zutage, weil die Untersuchung nur bei stehender Blase vorgenommen wurde.

4. Todesfälle sind unter den HA. nicht zu beklagen, dagegen 3 unter den von draußen Eingelieferten; 2 gingen an einer Infektion zugrunde, eine an Herzinsuffizienz. Vielleicht spielen hier die verschiedenen häuslichen

Verhältnisse in bezug auf Reinlichkeit ufw. eine gewisse Rolle.

5. Am häufigsten kamen Streptokokken und Staphylokokken gemeinsam im Scheideninhalt derjenigen Gebärenden vor, die von draußen eingeliefert wurden. Man fand sie bei 14,8% der Frauen, die später nicht erkrankten und in 15,3% derjenigen, die später fieberhaft erkrankten. Die Bösartigkeit der Bakterienkombination geht weniger hieraus hervor, als aus der Tatsache, daß ihr 2 Frauen zum Opfer fielen.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Siebke für die Überlassung des Themas, Herrn Prof. Dr. Schröder, damals Kiel, jetzt Leipzig, für das zur Verfügung gestellte Material, Herrn Prof. Dr. Rupp für die Übernahme des Referates und Herrn Dr. habil. Büttner für die freundliche Hilfe bei der Zusammenstellung meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Diese Arbeit wurde in Kiel unter Zugrundelegung der betreffenden Krankengeschichten im Jahre 1935 begonnen, die Aufsicht übernahm damals Herr Prof. Dr. Siebke.

Die Auswertung erfolgte während meiner Medizinalpraktikantenzeit an der Universitäts-Frauenklinik Bonn als Herr Prof. Siebke dorthin berufen wurde.

Für die Beratung bei der Auswertung bin ich Herrn Dr. med. Büttner, Assistenzarzt an der Universitäts-Frauenklinik Bonn zu besonderem Dank verpflichtet.

Literaturverzeichnis

- A. M. Claye: Puerperale Morbidität nach normaler Entbindung. Brit. med. J. 3576. 1929.
- Demme, Reinhold: Zusammenfassendes über die rektale Untersuchung (Zbl. f. Gyn. 1923, Nr. 31).
- Miller, Harold: A. D. Ben Marcwiz and M. E. Hodgen. J. americ. med. Assoc. 95, S. 923-925, 1930.
- Kehrer: Der Wert der rektalen Untersuchung bei der Geburtsleitung. M. m. W. 1921. 38.
- Kessler: Über die Beeinflussung des Scheidenchemismus durch Geburt und Wochenbett. (Arch. f. Gyn. Bd. 131, Heft 1).
- Krönig: Der Ersatz der inneren Untersuchung Kreißender durch die Untersuchung per rektum.
- Jafchke-Pankow: Lehrbuch d. Geburtshilfe. 1923.
- Schröder, Kessler, Hinrichs: Arch. f. Gyn. 128.
- Schultheiß: Über die Abhängigkeit des Wochenbettsverlaufs v. Zeitpunkt des Blasensprungs (Schweizer Med. W. 1929, 24, 619).
- Stoeckel: Lehrbuch der Geburtshilfe. 1935.
-

Lebenslauf.

Als Sohn des damaligen Ratsassessors Franz K ü n t -
z e l wurde ich, Karl-Heinz Küntzel, am 1. Januar 1909
in Dresden geboren. Ich besuchte vier Jahre lang die
Volkschule in Wilsdruff bei Dresden, wurde dann ein
Jahr lang privat unterrichtet, besuchte darauf die Quinta
des Realgymnasiums in Meißen und kam später in das
Hindenburg-Realgymnasium in Crossen an der Oder.
Dort bestand ich im März 1929 das Abitur. Im April
1929 begann ich in Kiel mein Medizinstudium. Im April
1932 bestand ich dort meine ärztliche Vorprüfung und
am 12. November 1935 ebenfalls in Kiel mein medizi-
nisches Staatsexamen. Als Medizinalpraktikant war ich
zunächst 9 Monate am Städtischen Krankenhaus in Kiel,
dann 3 Monate an der Universitätsfrauenklinik in Bonn.
Am 1. Dezember 1936 wurde ich approbiert. Vom 1. De-
zember 1936 bis zum 1. Februar 1937 arbeitete ich an der
Universitätsfrauenklinik Bonn als Volontär. Seit 1. Febr.
1937 bin ich als 2. Assistent am Evangelischen Kranken-
stift St. Martin in Koblenz, Kurfürstenstraße, beschäftigt.